



Concours ENSAM - ESTP - ECRIN - ARCHIMEDE

Epreuve de Mathématiques A PSI

durée 3 heures

L'usage des calculatrices est interdit

Dans tout le problème, \mathbf{R} désigne le corps des réels, E l'espace vectoriel des fonctions continues, définies sur $[0, 1]$ et à valeurs dans \mathbf{R} , F l'espace vectoriel des fonctions de classe C^1 , définies sur $[0, 1]$ et à valeurs dans \mathbf{R} .

Pour tout $f \in E$, on note $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|$ et on rappelle que l'on définit ainsi une norme sur E .

Si g est une application k fois dérivable sur $[0, 1]$, $g^{(k)}$ désigne la dérivée k -ième de g .

Préliminaires.

Soit $n \in \mathbf{N}^*$ et u une fonction de classe C^n sur $[0, 1]$.

On suppose que : $\forall k \in \{0, \dots, n-1\}$, $u^{(k)}(0) = 0$.

Prouver que : $\forall x \in [0, 1]$, $u(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} u^{(n)}(t) dt$.

Partie I : Pour $g \in F$ donnée, recherche de $f \in F$ vérifiant la relation :

$$(S) \quad : \quad \forall x \in [0, 1], \quad f(x) - \int_0^x f(t) dt = g(x).$$

Question 1.

1. Montrer l'équivalence :

$$f \in F \text{ est solution de } (S) \Leftrightarrow \left(\forall x \in [0, 1], f'(x) - f(x) = g'(x) \text{ et } f(0) = g(0) \right).$$

On note (*) l'équation différentielle $y' - y = g'(x)$.

2. Résoudre l'équation différentielle (*).

Question 2.

Prouver que (S) possède dans F une unique solution f définie par :

$$\forall x \in [0, 1], f(x) = g(x) + \int_0^x e^{x-t} g(t) dt.$$

Question 3 : Application.

Déterminer la solution f de (S) lorsque g est la fonction $x \in [0, 1] \mapsto \cos(x)$.

Partie II : Quelques propriétés de la fonction $T : f \in E \mapsto T(f)$ définie par :

$$\forall x \in [0, 1], T(f)(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

On définit l'application T qui à $f \in E$ associe l'application $T(f)$, définie sur $[0, 1]$ par :

$$\forall x \in [0, 1], T(f)(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, on note $T^n = T \circ T^{n-1}$, sachant que $T^0 = I_E$ (application identité de E).

Lorsque U est un endomorphisme continu de E , on désigne par $\|U\|$ le réel positif :

$$\|U\| = \sup_{\|f\|_\infty \leq 1} \|U(f)\|_\infty.$$

Question 1.

1. Montrer que T est un endomorphisme de E .
2. Préciser $\text{Ker}(T)$ et $\text{Im}(T)$.
3. Quel est l'ensemble des valeurs propres de T ?

Question 2.

1. Montrer que $\forall x \in [0, 1], |T(f)(x)| \leq \|f\|_\infty$.
En déduire que T est une application continue de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.
2. Prouver que $\|T\| \leq 1$.
3. On considère $f_0 : x \in [0, 1] \mapsto f_0(x) = 1$. Que vaut $\|T(f_0)\|_\infty$?
4. Calculer $\|T\|$.

Question 3.

Soit $n \in \mathbf{N}^*$.

1. Montrer que $T^n(f)$ est de classe C^n sur $[0, 1]$.
2. Prouver que pour tout entier naturel $k \in \{0, \dots, n-1\}$, $(T^n(f))^{(k)} = T^{n-k}(f)$.

3. Que vaut $(T^n(f))^{(n)}$? $(T^n(f))^{(k)}(0)$ pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$?
4. Montrer alors que : $\forall x \in [0, 1], (T^n(f))(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt$.
5. Préciser $\text{Ker}(T^n)$ et $\text{Im}(T^n)$.
6. Prouver que T^n est un endomorphisme continu de $(E, \|\cdot\|_\infty)$.
7. En utilisant la fonction f_0 définie à la question 2., prouver que : $\|T^n\| = \frac{1}{n!}$.
8. En déduire que : $\forall f \in E, \forall x \in [0, 1], \lim_{n \rightarrow +\infty} T^n(f)(x) = 0$. Préciser $\lim_{n \rightarrow +\infty} T^n$.

Partie III : Pour $g \in E$ donnée, recherche de $f \in E$ vérifiant

$$(S) : \forall x \in [0, 1], f(x) - \int_0^x f(t) dt = g(x).$$

On note H l'application qui à $f \in E$ associe l'application $H(f)$ définie sur $[0, 1]$ par :

$$\forall x \in [0, 1], H(f)(x) = \int_0^x e^{x-t} f(t) dt.$$

Question 1.

1. Montrer que H est un endomorphisme de E .
2. Prouver que : $\exists K \geq 0$ tel que $\forall x \in [0, 1], |H(f)(x)| \leq K \|f\|_\infty$.
En déduire que H est continue de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$ et que $\|H\| \leq e$.
3. Montrer que $H(f)$ est C^1 sur $[0, 1]$. Calculer, pour $x \in [0, 1], (H(f))'(x)$.

Question 2.

Prouver que $\forall f \in E, \forall x \in [0, 1]$, la série $\sum_{n \geq 1} (T^n(f))(x)$ converge absolument.

Pour tout x de $[0, 1]$ et tout f de E , on note $\Psi(f)(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} T^n(f)(x)$.

Question 3.

On se propose de montrer que $\Psi = H$.

1. On pose, pour n fixé dans \mathbf{N}^* , x fixé dans $[0, 1]$ et f fixée dans E :

$$\begin{aligned} v_n &: [0, x] \rightarrow \mathbf{R} \\ t &\mapsto v_n(t) = \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t). \end{aligned}$$

Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge normalement sur $[0, x]$.

2. Prouver alors que $\forall f \in E, \forall x \in [0, 1], \sum_{n=1}^{+\infty} (T^n(f))(x) = H(f)(x)$.

En déduire que $\Psi = H$.

Question 4.

1. On note $V = I_E - T$.

En calculant, pour $n \in \mathbf{N}$, $\left(\sum_{k=0}^n T^k \right) \circ V$, trouver $W \in L(E)$ telle que : $W \circ V = I_E$.

2. Prouver alors que l'équation (S) possède une unique solution h dans E .

3. Déterminer h .

4. Que constate-t-on ?